

FICHA TÉCNICA



“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS”

No. DE REGISTRO EN PANAMÁ: 81020

Composición Química

Ingrediente activo:	P/P
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-Dimetil ciclopropano carboxilato (Contiene 51.2 g de i.a. / kg)	5.12 %
Ingredientes inertes: Solventes y emulsificante	94.88 %
TOTAL:.....	100 %

CONTIENE: 51.2 GRAMOS DE DELTAMETRINA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

INSECTICIDA PIRETROIDE / POLVO HUMECTABLE

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

PRECAUCIÓN

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

USO RECOMENDADO:

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”; “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”; “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”; “NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”. “NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA. NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO: DELTAMIX® 5% PH es un insecticida piretroide, con acción de contacto e ingestión. Se recomienda su uso en interiores y exteriores de inmuebles como casas habitación, oficinas, hoteles, mercados, restaurantes, hospitales, industrias de alimentos, edificios, centros de salud, almacenes, clínicas, transportes, cines, teatros, escuelas, cuarteles.

PLAGAS	DOSIS	APLICACIÓN
Moscas (<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Fannia spp.</i>) Mosquitos (<i>Anopheles spp.</i> , <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex spp.</i>) Pulgas (<i>Xenopsylla cheopis</i>) Hormigas (<i>Monomorium pharaonis</i> , <i>M. minimum</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Lasius niger</i>) Chinches (<i>Cimex lectularius</i>) Triatominos (<i>Rhodnius prolixus</i>)	5 g de Deltamix en 1 L de agua 1 L de mezcla rinde 25 m² 10 L rinden 250 m²	DELTAMIX 5% PH se aplica con cualquier tipo de equipo, una vez seco el depósito de la aplicación, los cristales microscópicos del insecticida quedan firmemente adheridos a la superficie logrando un control residual más prolongado. Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una suspensión uniforme.
Cucarachas (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Blattella germanica</i>)	10 g de Deltamix en 1 L de agua	Mantener la mezcla en agitación durante la aplicación.
Arañas (<i>Latrodectus spp.</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>)	10-20 g de Deltamix en 1 L de agua	

ÁREAS ABIERTAS: Aplique el producto sobre las paredes de la construcción, patios, marcos de puertas, ventanas, rincones y lugares detectados en donde transitan y se ocultan los insectos. Para evitar re-infestaciones recomendamos una barrera de protección, aplicando sobre una banda de 1 a 2 metros de ancho (sobre suelo y/o vegetación) alrededor del área cubierta que se quiera proteger. Utilizar las mismas dosis recomendadas para **áreas cerradas**.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos. Los alimentos y los enseres de cocina deben protegerse.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico a peces y moderadamente tóxico para abejas.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y

ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repita la operación hasta que el vómito salga claro.

“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL: “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

POR VÍA DÉRMICA: “EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: (507) 269 2741

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroides.

TRATAMIENTO: No hay antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo Diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1X1000) vía intravenosa o subcutánea; repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FABRICADO POR:

QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

MAQUILADO POR:

AGROMAQUILAS S.A. de C.V.

Calle Oriente No.3, Zona
Oriente, Lote 45. Parque
Industrial, Atitlaquia, Hgo.
C.P. 42970, México D. F.
Tel: (01778) 7-38-03-54

DISTRIBUIDOR:

QUIMIX de Panamá, S.A.

Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol,
Oficina No.A-16, Cd. de Panamá.

HECHO EN MÉXICO

10.11.16 TR

QUIMIX DE CENTROAMÉRICA, S.A.

AV. DEL FERROCARRIL (ATANASIO TZUL) 19-97, ZONA 12 EMPRESARIAL EL CORTIJO, BODEGA No. 403,
GUATEMALA, C.A. TEL: (00 502) 2473 4074 (75) FAX: (00 502) 2474 4195

www.quimix.com.mx