

FICHA TÉCNICA



"RODENTICIDA ANTICOAGULANTE / BLOQUE PARAFINADO PERFORADO"

No. DE REGISTRO: 80823

Composición Química

Ingrediente activo: P/P

Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il) -3-hidroxi-1-fenil-propil] -4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona.

(Equivalente a 0.05 g de i.a./kg) 0.005 %

Ingredientes inertes:

Atrayentes y vehículo. 99.995 % Total: 100.00 %

CONTIENE: 0.05 GRAMOS DE BROMADIOLONA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN BLOQUE PARAFINADO PERFORADO

"PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE MANIPULARLO Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO: PRECACUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFELTO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

APLICAR DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE SOBRE **ALIMENTOS** UTENSILIOS DE COCINA"; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES "NO SE TRANSPORTE DOMÉSTICOS; **ALMACENE** JUNTO Α **PRPDUCTOS** ALIMENTICIOS Y ROPA"; MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES "NUNCA REUTILICE ENVASE". "NO COMER BEBER O **CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO"** "LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO" "EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado pararealizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES

TRATADOS: Se puede entrar al área tratada cada vez que sea necesario. Revisar diariamente las trampas. Repetir hasta que dejen de observarse indicios de actividad de ratas y ratones.

INSTRUCCIONES DE USO: ERRADIC® BLOCK es un rodenticida anticoagulante de segunda generación de una sola ingesta, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores en el ámbito urbano.



Es útil para el control de roedores como:

DOSIS Y MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

Plagas	Grado de Infestación	Dosis	Aplicación y dosis
RATAS	LIGERA A MODERADA	1 6 2	
Rata de alcantarilla Rattus norvegicus Rata de los tejados Rattus rattus	ALTA	2 ó 5	Colocar la cantidad del cebo por punto de cebado cada 5 a 10 metros.
RATONES Ratón doméstico Mus musculus	LIGERA A ALTA	1 ó 2	Colocar la cantidad del cebo cerca de los nidos o madrigueras, o cada 3 a 4 metros de distancia.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Se recomienda colocar el cebo dentro de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Se recomienda colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

"EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO"

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

la ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, nausea, vómito, salivación, cansancio, vértigo y días después hemorragias internas. Por inhalación puede causar irritación de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento, picor, sensación de dolor. En los ojos puede causar irritación temporal.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR VÍA ORAL: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repita la operación hasta que el vómito salga claro. Si la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO. LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo químico: Hidroxicumarina.

Antídoto y tratamiento específico: El tratamiento debe ser sintomático. Administrar vitamina K1(Fitonadiona). Dosis si el paciente está sangrando: 10mg I.V. en adultos y 5mg I.V. en niños. Si no está sangrando: 15-25mg vía oral o 5-10mg I.M., en niños 5-10mg vía oral o 1-5mg I.M. repetir si es necesario. Debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que los niveles de protrombina queden normales y la hemorragia haya

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: (507) 2692741



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos). En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FORMULADO EN MÉXICO DISTRIBUIDOR: QUIMIX S.A. de C.V. AV. Central No. 206, 2 Piso, Col. San Pedro de los Pinos C. P. 01180, Alcaldía Álvaro Obregón, México, CDMX TEL: (55) 52 78 46 80

QUIMIX de Panamá S.A.
Auto Depot, vía Tocumen frente
a El Crisol, Oficina No. A-16,
Ciudad de Panamá

FORMULADO EN MÉXICO

M.V.Z. XIMENA FRANCO GASCA FECHA DE REVISIÓN: ENERO DE 2023 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: ENERO DE 2024

> QUIMIX DE PANAMA, S.A. AUTO DEPOT, VÍA TOCUMEN FRENTE A EL CRISOL, OFICINA NO. A-16, CIUDAD DE PANAMÁ

> > www.quimix.com.mx